

FRUTOS MONOTALÁMICOS COMPUESTOS frutos
agregados o colectivos

POLIAQUENIO o aqueneto: conocarpo (frutilla) y
cinorrodon (rosal)




POLIFOLÍCULO o foliceto (braquiquito)

POLIDRUPA o drupeto (frambuesa)


POLISÁMARA o samareto (tulipanero)



CONOCARPO



CINORRODÓN



AQUENIOS



MONOTALÁMICOS COMPUESTOS

POLIDRUPA



Rubus ulmifolius


FRUTOS POLITALÁMICOS, múltiples o infrutescencia

- SICONO (higuera)
- SOROSIO (ananá; morera, maclura)
- TRIMOCONO (casuarina)

SICONO



Ficus spp., fam. Moraceae



SOROSIO



Ananas comosus (L.) Merrill. (bayas)

SOROSIOS



Morera *Morus* sp
Drupas múltiples



Maclura pomifera (Raf.)
Schneid.

TRIMOCONO



Casuarina sp. *Casuarinaceae*

Lecturas recomendadas

Roth, I. 1977. Fruits of Angiosperms. Enciclopedia of plant anatomy Band X, Teil 1, Gerbrüder Borntraeger, Berlin, Stuttgart. Págs. 291-311.

Spjut, R. W. 1994. A systematic treatment of fruit types. New York Botanical Garden. 181 pages. Worldbotanical.com/fruit_types.htm